



## PENGGUNAAN APD PADA SAAT MELAKUKAN TINDAKAN DI IBS

RSUD dr. R. Goeteng  
Taroenadibrata  
Purbalingga

No. Dokumen:

067/013/2020

No. Revisi :

Hal. :

1/1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tgl. Terbit :

2 April 2020

Ditetapkan :

Direktur RSUD dr. R. Goeteng  
Taroenadibrata Purbalingga

  
**Dr. Nonot Mulyono, M.Kes**  
NIP. 19620909 198803 1 011

#### Pengertian

: Adalah tata cara menggunakan alat pelindung diri (APD) oleh petugas (dokter operator, dokter anestesi, penata anestesi dan perawat) pada saat melakukan tindakan operasi di Kamar Operasi.

#### Tujuan

- :
1. Untuk meningkatkan mutu asuhan pasien dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di Rumah Sakit.
  2. Agar semua petugas kesehatan ,mengetahui cara penanganan dan pencegahan penularan virus corona-19 pada pasien ke petugas dan lingkungan sekitar.
  3. Semua petugas kesehatan yang menangani pasien dengan Suspek Covid/positif Covid dapat mengetahui proteksi yang harus dilakukan terhadap dirinya.
  4. Mencegah terjadinya infeksi silang dari pasien ke pasien lainnya.

#### Kebijakan

: Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor: 066/ 003.1/ 2018 Tentang Kebijakan Pelayanan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dalam hal Pelayanan Kedokteran.

#### Prosedur

- :
- A. Pelayanan pada pasien **PDP**
1. Petugas melakukan cuci tangan sesuai prosedur
  2. Pada saat tindakan yang menimbulkan **aerosol** , Petugas menggunakan APD yang terdiri dari : masker N95, masker bedah, gown, sarung tangan, pelindung mata, apron , pelindung wajah, cover all, sepatu boots.
  3. Setelah selesai tindakan, lakukan dekontaminasi APD dan ruangan kemudian lepaskan APD , masukkan ke dalam tempat APD infeksius.
  4. Petugas Laundry melakukan desinfeksi APD yang dapat dipakai kembali sesuai prosedur.
  5. Petugas CSSD menyiapkan Gown steril.
  6. Petugas cuci tangan sesuai prosedur.
- B. Pelayanan pada pasien **bukan PDP**
1. Petugas melakukan cuci tangan sesuai prosedur
  2. Petugas menggunakan APD yang terdiri dari : masker bedah, gown, sarung tangan, pelindung mata, sepatu boots.
  3. Setelah selesai tindakan, lepaskan APD , masukkan ke dalam tempat APD infeksius.
  4. Petugas Laundry melakukan desinfeksi APD yang dapat dipakai kembali sesuai prosedur.
  5. Petugas CSSD menyiapkan Gown steril.
  6. Petugas cuci tangan sesuai prosedur.

#### Unit terkait

- :
1. IBS
  2. CSSD
  3. ISPL